

Endovet® Inyectable

Número de Registro Q-0524-082

USO VETERINARIO

Ivermectina

Solución Inyectable

Desparasitante Endectocida
en Solución Inyectable

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen

Ivermectina1 g

Vehículo c.b.p. 100 ml

CARACTERÍSTICAS

Endovet® Inyectable es un antiparasitario de amplio espectro, efectivo contra parásitos internos y externos, su principio activo la ivermectina químicamente pertenece al grupo de las avermectinas.

Endovet® Inyectable posee una elevada efectividad contra nematodos y se mantiene hasta por 70 días con una dosis lo que implica menos tratamientos por año y que disminuyan las infestaciones parasitarias en los potreros.

Elimina nematodos resistentes a otros antiparasitarios, tiene un mecanismo de acción diferente.

Endovet® Inyectable posee un amplio margen de seguridad, puede usarse en hembras gestantes, lactantes, sementales y animales jóvenes sin ocasionar efectos negativos.

Endovet® Inyectable contribuye a la mejora de los parámetros productivos y reproductivos en el ganado tratado, el ganado tiene una mejor apariencia y alcanza un crecimiento más rápido. No interfiere la respuesta inmune pudiendo administrarse simultáneamente con vacunas.

INDICACIONES

Desparasitante endectocida de amplio espectro indicado para el control de las parasitosis causadas por nematodos gastrointestinales, renales y de las conjuntivas; tanto en su fase larvaria, como adulta, también es útil en el control de las infestaciones por piojos chupadores y ácaros productores de sarna, en Bovinos productores de carne, de leche y de doble propósito (durante el período seco), Ovinos, Caprinos y Cerdos.

DOSIS.

Bovinos productores de carne, de leche y de doble propósito (durante el período seco): 1 ml por cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg/kg pv de ivermectina).

Ovinos y Caprinos: 0.5 ml por cada 25 kg de peso (equivalente a 200 mcg/kg pv de ivermectina).

Porcinos: 1 ml por cada 33 kg de peso (equivalente a 303.03 mcg/kg pv de ivermectina).

Frecuencia: Para el control de nematodos un tratamiento cada 3-4 meses, todo animal de nuevo ingreso al hato debe ser tratado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

ADVERTENCIAS

Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la ivermectina, por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados en forma segura, enterrándolos o incinerándolos.

Prohibido el uso de este producto en el control de la garrapata *Boophilus spp.*

Periodo de retiro

Carne 28 días.

No usar en animales productores de leche para consumo humano.

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos.

Conservar el producto en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y a una temperatura entre 15 y 30° C.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 10, 50, 100 y 500 ml

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V.

Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx Página Web: www.riverfarma.com.mx
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777