

# Rafoxcur®

Número de Registro Q-0524-092  
**USO VETERINARIO**

## Rafoxanida

Suspensión Oral

Fasciolicida y Antihelmíntico Oral

### FÓRMULA

Cada ml contiene  
Rafoxanida 200 mg  
Vehículo c.b.p. 1 ml

### CARACTERÍSTICAS

**Rafoxcur®** es un fasciolicida y antihelmíntico en suspensión oral. Su principio activo, la rafoxanida, químicamente pertenece al grupo de las salicilanilidas.

**Rafoxcur®** posee una elevada eficacia contra Fasciolas adultas y logra un buen control contra fases juveniles de 4 semanas de edad.

**Rafoxcur®** es efectivo contra los estados adultos de *Haemonchus* y *Bunostomum*.

**Rafoxcur®** es efectivo contra las fases juveniles y adultas del parásito *Paramphistomum spp.*

**Rafoxcur®** es efectivo contra las fases larvianas del *Oestrus ovis*.

**Rafoxcur®** controla parásitos resistentes a otros antihelmínticos, posee un mecanismo de acción diferente.

**Rafoxcur®** es fácil de dosificar, es una misma dosis independientemente del parásito por controlar o la especie animal por medicar.

**Rafoxcur®** con su uso se mejora los parámetros productivos y reproductivos en el ganado.

### INDICACIONES

Antihelmíntico y fasciolicida efectivo para el control de las parasitosis gastrointestinales y hepáticas causadas por nematodos y trematodos, así como, para el control de las larvas de mosca (*Oestrus ovis*) en bovinos, ovinos y caprinos, así como *Paramphistomum spp* en bovinos productores de carne, de leche y de doble propósito (durante el período seco).

### DOSIS

En bovinos productores de carne, de leche y de doble propósito (durante el período seco), caprinos y ovinos 1 ml por cada 20 kg de peso vivo (Equivalente a 10 mg/kg de rafoxanida).

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, como toma directa o mediante el uso de jeringa dosificadora.

### ADVERTENCIAS

Antes de usar compruebe el peso de los animales para evitar la sobredosificación o subdosificación del producto.

La sobredosificación puede originar signos de inapetencia y diarrea en bovinos, los ovinos y caprinos pueden presentar alteraciones oculares como cataratas.

Periodo de retiro

No utilizar el producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No utilizar el producto en bovinos en producción de leche destinada al consumo humano

Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados apropiadamente.

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C y 25°C.

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos.

**Agite el producto antes de usar.**

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

### **PRESENTACIÓN**

Frasco con 50, 100, 250 y 500 ml.

### **HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V.**

Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México,

México. E-mail: [riverfarma@riverfarma.com.mx](mailto:riverfarma@riverfarma.com.mx) Página Web: [www.riverfarma.com.mx](http://www.riverfarma.com.mx)

Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777