

Analvet®

Reg. SAGARPA Q-0524-017
USO VETERINARIO

Dipirona Sódica

Solución Inyectable

Analgésico, Antipirético, Antiespasmódico y
Antiinflamatorio no Esteroide

FÓRMULA

Cada 100 ml contienen
Dipirona Sódica50 g
Vehículo c.b.p.100 ml

- ➔ **Analvet®** es un analgésico que actúa a nivel talámico de la corteza cerebral, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas (histamina y bradiquinina), responsables de cualquier afección dolorosa. Contiene como principio activo la dipirona o metamizol, fármaco que pertenece al grupo de las pirazonas con efectos analgésico no narcótico, antipirético, antiinflamatorio y antiespasmódico.
- ➔ Ejerce efecto sobre el sistema termorregulador central y periférico, para disminuir rápidamente la fiebre en las enfermedades infecciosas como pasteurelosis neumónica y otras neumonías, piroplasmosis, anaplasmosis y salmonelosis.
- ➔ En equinos es útil como coadyuvante en el tratamiento de los espasmos y excesivo peristaltismo intestinal en cólicos. En estados espasmódicos de la musculatura uterina durante el parto en los mamíferos. En porcinos es particularmente útil para evitar que las cerdas primerizas devoren a sus lechones (30 ml por vía intramuscular).
- ➔ Como coadyuvante antiinflamatorio (traumatismos, heridas quirúrgicas, artritis, tendinitis, miositis, reumatismo, lumbago en el caballo).

INDICACIONES

Se recomienda en el tratamiento sintomático de traumatismos, padecimientos neuralgésicos y dolores post-operatorios, posee además un efecto antipirético útil para controlar la fiebre y como coadyuvante en el cólico Equino.

DOSIS

Equinos: De 4-8 ml por cada 100 kg de peso.
Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 1 ml cada 10 kg de peso.
Caninos y Felinos: 0.1 ml por cada 2 kg de peso.
En todos los casos cada 8 horas, durante 5 días máximo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intravenosa lenta o intramuscular profunda.

ADVERTENCIAS

En caso de sobredosis o tratamientos prolongados puede inducir lesión hepática moderada en el equino.

No mezclar el producto con clorpromazina, barbitúricos o fenilbutazona porque puede producirse hipotermia severa.

No se recomienda en animales con presencia de discrasia sanguínea.

No usar en equinos destinados para consumo humano.

Periodo de retiro.

Carne: 24 horas

Leche: 24 horas.

Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados, enterrándolos o incinerándolos.

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 30° C.

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

PRESENTACIÓN

Frasco con 50 y 100 ml

REGISTRO PARA

Costa Rica	MAG MX7-02-03-056
El Salvador	VE2013094811
Honduras	PF-836
Nicaragua	3814
Panamá	RF-557-11
Rep. Dominicana	1491-92

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V.

Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Del. Coyoacán. C.P.04230, México, D.F.

E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx Página Web: www.riverfarma.com.mx

Tel. 6389-6687, 6389-6688, 6389-6689. En México Lada sin costo: 01-800-505-7777