Benzamin B12

Número de registro Q-0524-018
USO VETERINARIO
Diminazeno aceturato+B12+antipirina
Solución Inyectable
Antiparasitario hemático inyectable

FÓRMULA

Cada ml contiene	
Diminazeno aceturato	42 mg
Antipirina	400 mg
Cianocobalamina (vitamina B12)	40 mcg
Vehículo c.b.p.	1 ml

CARACTERÍSTICAS

Benzamin B12 es un antiparasitario hemático con vitamina B12 (que funciona favoreciendo la formación de eritrocitos) y antipirina (que disminuye los estados febriles y mejora la condición física del animal).
El uso de Benzamin B12 está indicado para eliminar los protozoarios causantes de la babesiosis y tripanosomiasis, así como controlar los signos consecuentes a los trastornos mencionados en los bovinos, equinos y caninos.
Por lo general se logra una respuesta pronta y satisfactoria cuando Benzamin B12 es administrado al inicio de la infección, antes de causar anemia aguda o trastornos en el sistema nervioso.
Benzamin B12 permite mantener un equilibrio enzoótico. Esto consiste en que el producto no elimina al 100% de los parásitos; los que no son eliminados, estimulan la producción de anticuerpos por parte del animal afectado, lo que permite un estado de inmunidad mucho más seguro que la esterilización total. Por lo general, la temperatura corporal desciende a las 24-48 horas del tratamiento, reduciendo los índices de mortalidad.

INDICACIONES

Benzamin B12 está orientado a eliminar los protozoarios causantes de la babesiosis y tripanosomiasis, en los bovinos productores de carne y leche, equinos y caninos.

DOSIS

1 ml por cada 12 kg de peso (equivalente a 3.5 mg por kg de peso de Diminazeno aceturato, 33.33 mg por kg de antipirina y 3.33 mcg por kg de cianocobalamina).
El contenido del frasco con 25 ml es para 300 kg de peso.
Frecuencia: Normalmente una dosis es suficiente; en caso de ser requerido, repetir la dosis cada 24 horas, máximo 3 aplicaciones a juicio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda, no se debe aplicar por ninguna otra vía.

ADVERTENCIAS

No administrar este producto en equinos para consumo humano.
En equinos puede causar una reacción inflamatoria localizada en el sitio de la inyección, la cual se evita fraccionando la dosis en tres partes.

Periodo de retiro.
Carne: 21 días.
Leche: 72 horas.
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 30º C. Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados, enterrándolos o incinerándolos.
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos.
Consulte al Médico Veterinario. Su venta requiere receta médica.

PRESENTACIÓN
Frasco con 25 ml

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V.
Prol. Calzada de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx
Página Web: www.riverfarma.com.mx
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777