Micofin® Tabletas

Número de registro Q-0524-106

USO VETERINARIO

Terbinafina

Tabletas

Antimicótico oral

FÓRMULA

Cada tableta contiene	
Terbinafina clorhidrato equivalente a de terbinafina base	100 mg
Excipiente c.b.p.	1 tableta

CARACTERÍSTICAS

Micofin® Tabletas es un antimicótico de amplio espectro oral. Su principio activo, la terbinafina, químicamente pertenece a los derivados de las alilaminas.

Micofin® Tabletas logra altas concentraciones en los sitios infectados y de difícil acceso como piel, garras y pelo dada su alta afinidad por la queratina.

Micofin® Tabletas por su elevada efectividad es el antimicótico de primera elección en el tratamiento sistémico de las micosis superficiales presentes en áreas extensas del cuerpo o en sitios en los cuales por su proximidad a mucosas y órganos como los ojos no se puede utilizar el tratamiento tópico.

INDICACIONES

Antimicótico oral en tabletas, indicado para el tratamiento de las infecciones micóticas de la piel (tiña) y garras causadas por dermatofitos (Microsporum spp, Trichophyton spp y Epidermophyton floccosum) y de las infecciones cutáneas causadas por levaduras del género Candida (Candida albicans) y como coadyuvante en el tratamiento de la otitis causada por Malassezia spp; en donde la terapia tópica está limitada y en base a la extensión y severidad de las infecciones en caninos y felinos (domésticos).

DOSIS

Caninos: 1-2 tabletas por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 10 a 20 mg de terbinafina por kg de peso).

Felinos: ½ tableta por cada 5 kg de peso vivo (equivalente a 10 mg de terbinafina por kg de peso).

Frecuencia: Cada 24 horas durante dos semanas.

En el tratamiento de onicomicosis se requieren de 6 semanas a 3 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, como toma directa.

ADVERTENCIAS

El uso irregular o la descontinuación prematura del tratamiento conllevan al riesgo de recurrencia.

Si no hay signos de mejoría después de dos semanas de tratamiento, deberá verificarse el diagnóstico.

La resolución completa de los síntomas y signos de infección puede no conseguirse sino hasta varias semanas después de la curación micológica.

En caso de sobredosis o ingesta accidental del producto, no hay antídoto específico, por lo que se recomienda el lavado gástrico y tratamiento de sostén.

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre

15 y 30°C.
No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

PRESENTACIÓN
Expedidor con 25 carteras con 4 tabletas cada una.

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V.
Prol. Calzada de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx
Página Web: www.riverfarma.com.mx
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777