

Dolo-Vet Ótico

Reg. SAGARPA Q-0524-091
USO VETERINARIO

Ketorolaco - Gentamicina – Miconazol

Suspensión Ótica

Antibiótico Bacteriostático de Amplio Espectro en
Suspensión Ótica, con Efecto Analgésico
Antiinflamatorio, Antiprurítico y Antifúngico

FÓRMULA

Cada ml contiene
Gentamicina sulfato
equivalente a 5 mg
de Gentamicina base
Ketorolaco trometamina
equivalente a 5 mg
de Ketorolaco base
Miconazol nitrato
equivalente a 20 mg
de Miconazol base
Vehículo c.b.p..... 1 ml

- ➔ **Dolo-Vet® Ótico** es un antibiótico de amplio espectro en suspensión ótica, su acción clínica incluye además efecto antimicótico, antiinflamatorio, analgésico local y antiprurítico
- ➔ **Dolo-Vet® Ótico** está indicado para el tratamiento de otitis externas, causadas por bacterias y levaduras en perros y gatos.
- ➔ **Dolo-Vet® Ótico** facilita la penetración de la gentamicina y el miconazol incluidos en su fórmula gracias a su efecto antiinflamatorio, obteniendo mejores resultados en el tratamiento.
- ➔ Posee propiedades antipruríticas, por lo que proporciona mejoría y bienestar a la mascota, disminuyendo la presencia de complicaciones secundarias como hematoma auricular y automutilación debido al intenso rascado de la mascota.
- ➔ Actúa contra los principales agentes patógenos causantes de infección de los sacos anales.
- ➔ **Dolo-Vet® Ótico** coadyuva en el tratamiento de las dermatitis bacterianas y fúngicas en perros y gatos.

INDICACIONES

Dolo-vet Ótico está indicado en el tratamiento de otitis externas, dermatitis bacterial y/o fúngica en felinos y caninos, así como en infecciones de los sacos anales de los perros.

DOSIS

Otitis externas:

2-3 gotas por oreja afectada con una frecuencia de 2 veces al día durante 7-10 días, dependiendo de la severidad del caso y/o a juicio del Médico Veterinario.

Nota: antes de la administración deberá lavarse y limpiarse la zona afectada con agua oxigenada y/o agua caliente.

Dermatitis:

Aplicar en el área afectada una capa delgada tres veces al día durante siete días.

Sacos anales:

Después de vaciar el contenido de los sacos, instilar la suspensión hasta llenarlos con el producto, normalmente con un tratamiento es suficiente de requerirse más aplicaciones, la frecuencia es a juicio del médico veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica y ótica.

ADVERTENCIAS

Su uso está contraindicado en animales hipersensibles a alguno de los componentes de la fórmula. Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 30° C.

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos.

Agítese antes de usarse.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 frascos de 10 ml cada uno

REGISTRO PARA

Costa Rica	MAG MX7-41-02-2179
El Salvador	VE2013094816
Nicaragua	5185
Panamá	RF-3346-05
Rep. Dominicana	4009

HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V.

Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Del. Coyoacán. C.P.04230, México, D.F.

E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx Página Web: www.riverfarma.com.mx

Tel. 6389-6687, 6389-6688, 6389-6689. En México Lada sin costo: 01-800-505-7777